

Brunelliaceae

por José Angel García-Beltrán

Géneros: 1 | Nativos: 1, Endémicos: 0 | Exóticos: 0, Naturalizados: 0.
Especies: 1 | Nativas: 1, Endémicas: 0 | Exóticas: 0, Naturalizadas: 0.
Taxones: 1 | Nativos: 1, Endémicos: 1 | Exóticos: 0, Naturalizados: 0.
Taxones excluidos: 0.

Datos: Compilados a partir de León & Alain (1951), Cuatrecasas (1970) y la revisión de los materiales disponibles en los herbarios HAC, HAJB, NY y US.

Citación: García-Beltrán, J.A. 2024. *Brunelliaceae*. Pp. 261. En: GEPC. Catálogo de las Plantas de Cuba. Planta! – Plantlife Conservation Society, Vancouver. https://doi.org/10.70925/cat.2024_040

Para datos adicionales o errores detectados contactar a José Angel García-Beltrán (autor para correspondencia y editor: joangelitog@gmail.com).

Brunellia comocladifolia subsp. ***ubensis*** Cuatrec.

– “*Brunellia comocladifolia*” sensu auct.

HÁBITO: Árbol

DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Gr SC Gu**)

FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano, bosque nublado, bosque de pinos montano, matorral montano, bosque secundario, matorral secundario

Referencias

Cuatrecasas, J. 1970. *Brunelliaceae*. Fl. Neotrop. Monogr. 2.

León, Hno. & Alain, Hno. 1951. Flora de Cuba II. Dicotiledóneas: *Casuarinaceae* a *Meliaceae*. Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio “De La Salle” 10.