Buxaceae

por Pedro A. González Gutiérrez

Géneros: 1 | Nativos: 1, Endémicos: 0 | Exóticos: 0, Naturalizados: 0.
Especies: 37 | Nativas: 37, Endémicas: 35 | Exóticas: 0, Naturalizadas: 0.
Taxones: 44 | Nativos: 44, Endémicos: 42 | Exóticos: 0, Naturalizados: 0.
Taxones excluidos: 1.

Datos: Compilados a partir de Köhler (2014) y la revisión de los materiales de herbario compilados por Köhler (2024+).

Citación: González, P.A. 2024. *Buxaceae*. Pp. 267-271. En: GEPC. Catálogo de las Plantas de Cuba. Planta! – Plantlife Conservation Society, Vancouver. https://doi.org/10.70925/cat.2024_043

Para datos adicionales o errores detectados contactar a Pedro A. González Gutiérrez (autor para correspondencia: pagg74@yahoo.es) y/o José Angel García-Beltrán (editor: joangelitog@gmail.com).

Buxus acuminata (Griseb.) Müll. Arg. ≡ *Tricera acuminata* Griseb.
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano (sobre rocas calizas)

Buxus acunae Borhidi & O. Muñiz
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho**)
FORMACIONES VEGETALES: Matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus aneura Urb.
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus bahamensis Baker ≡ *Tricera bahamensis* (Baker) Britton
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Nativa (**VC Cam LT Ho**) | **Ja Bah Cay**
FORMACIONES VEGETALES: Bosque siempreverde microfilo, matorral xeromorfo costero y subcostero

Buxus bissei Eg. Köhler
– *"Buxus macrophylla"* sensu auct.
HÁBITO: Árbol/Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano, bosque nublado, bosque de galería (montano)

Buxus braimbridgeorum Eg. Köhler
?= *Buxus crassifolia* var. *oblongata* Borhidi & O. Muñiz
HÁBITO: Árbol/Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho**)

FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano, bosque nublado, bosque de pinos montano, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus brevipes (Müll. Arg.) Urb. ≡ *Buxus citrifolia* var. *brevipes* Müll. Arg. ≡ *Tricera brevipes* (Müll. Arg.) Britton
– *"Tricera fasciculata"* sensu auct.
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**PR Art**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque siempreverde mesófilo, complejo de vegetación de mogotes

Buxus crassifolia (Britton) Urb. ≡ *Tricera crassifolia* Britton
HÁBITO: Árbol/Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus cristalensis Eg. Köhler & P. A. González
HÁBITO: Árbol/Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho SC**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque de pinos montano, bosque pluvial montano, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus cubana (A. Rich.) Baill. ≡ *Tricera cubana* A. Rich.
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque siempreverde mesófilo

Buxus ekmanii Urb. subsp. ***ekmanii***
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Complejo de vegetación de mogotes

Buxus ekmanii subsp. ***woodfredensis*** Eg. Köhler
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho SC**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano

Buxus excisa subsp. ***costata*** Eg. Köhler
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano

Buxus excisa Urb. subsp. ***excisa***
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano

Buxus foliosa (Britton) Urb. ≡ *Tricera foliosa* Britton
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque de galería (montano), matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus glomerata (Griseb.) Müll. Arg. ≡ *Tricera glomerata* Griseb.
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Nativa (**Hab Ci CA Cam LT Ho SC Gu**) | **Esp**
FORMACIONES VEGETALES: Bosque siempreverde microfilo, matorral xeromorfo costero y subcostero, matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina

Buxus gonoclada (Griseb.) Müll. Arg. subsp. ***gonoclada*** ≡ *Tricera gonoclada* C. Wright ex Griseb. ≡ *Buxus retusa* var. *gonoclada* (Griseb.) M. Gómez
= *Buxus heterophylla* Urb.

= *Tricera flaviramea* Britton ≡ *Buxus flaviramea* (Britton) Mathou
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**May Mat VC Ci SS CA Ho**)
FORMACIONES VEGETALES: Matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus gonoclada subsp. ***orientensis*** Eg. Köhler
HÁBITO: Árbol
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho SC Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus gonoclada subsp. ***toldoensis*** Eg. Köhler
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus imbricata Urb.
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho SC**)
FORMACIONES VEGETALES: Matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus jaucoensis Eg. Köhler
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque siempreverde microfilo

Buxus koehleri P. A. González & Borsch
HÁBITO: Árbol
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus leivae Eg. Köhler
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque nublado, bosque de galería (montano), matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

[***Buxus macrophylla*** (Britton) Fawc. & Rendle] ≡ *Tricera macrophylla* Britton
HÁBITO: Arbusto
TAXÓN EXCLUIDO: Referido por error | **Ja**
FORMACIONES VEGETALES: –

Buxus marginalis (Britton) Urb. ≡ *Tricera marginalis* Britton
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque de pinos montano, bosque pluvial montano, bosque de galería (montano), matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus moana Alain
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque de pinos montano, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus muelleriana Urb. ≡ *Tricera muelleriana* (Urb.) Britton
– *"Tricera laevigata"* sensu auct.
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho SC**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano, bosque de galería (montano)

Buxus nipensis Eg. Köhler & P. A. González
HÁBITO: Árbol/Arbusto

DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho SC**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano, bosque de pinos montano, bosque de galería (montano), matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus olivacea Urb.
HÁBITO: Árbol
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho SC Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque de galería (montano), bosque siempreverde mesófilo

Buxus pilosula subsp. ***cacuminis*** Eg. Köhler
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**SC**)
FORMACIONES VEGETALES: Matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus pilosula Urb. subsp. ***pilosula***
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho**)
FORMACIONES VEGETALES: Matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus pseudaneura Eg. Köhler
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque de galería (montano), matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus retusa subsp. ***microphylla*** Eg. Köhler
HÁBITO: Árbol/Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho SC**)
FORMACIONES VEGETALES: Matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus retusa (Griseb.) Müll. Arg. subsp. ***retusa*** ≡ *Tricera retusa* Griseb.
= *Buxus historica* Borhidi & O. Muñiz
HÁBITO: Árbol/Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus revoluta (Britton) Mathou ≡ *Tricera revoluta* Britton
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus rheedioides Urb.
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho SC**)
FORMACIONES VEGETALES: Matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus rotundifolia (Britton) Mathou ≡ *Tricera rotundifolia* Britton
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque de pinos montano, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus sclerophylla Eg. Köhler
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Matorral xeromorfo costero y subcostero

Buxus serpentinicola Eg. Köhler
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus shaferi (Britton) Urb. ≡ *Tricera shaferi* Britton
= *Buxus baracoensis* Borhidi & O. Muñiz
= *Buxus obovata* Urb.
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho SC Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque de pinos montano, bosque de galería (montano), matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus triptera Eg. Köhler
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano

Buxus vaccinioides (Britton) Urb. ≡ *Tricera vaccinioides* Britton
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque de galería (montano), matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

Buxus wrightii subsp. ***leonii*** (Britton) Eg. Köhler ≡ *Tricera leonii* Britton ≡ *Buxus leonii* (Britton) Mathou
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**PR Art**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque de galería (montano), matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina

Buxus wrightii Müll. Arg. subsp. ***wrightii*** ≡ *Tricera microphylla* Griseb. [non *Buxus microphylla* Siebold & Zucc.]
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**PR Art**)
FORMACIONES VEGETALES: Matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina

Buxus yunquensis Eg. Köhler
HÁBITO: Árbol/Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, complejo de vegetación de mogotes

Referencias

Köhler, E. 2014. *Buxaceae*. Fl. Rep. Cuba, Ser. A. Pl. Vasc. 19(1). https://doi.org/10.3372/frc.19.1

Köhler, E. 2024+. *Buxaceae*. En: Greuter, W. & Rankin, R. (red.). Base de Datos de especímenes de la Flora de Cuba - con mapas de distribución, v. 16. https://ww3.bgbm.org/FloraOfCuba/