Caprifoliaceae

por José Angel García-Beltrán y Ana Gabriela López-García

Géneros: 3 | Nativos: 1, Endémicos: 0 | Exóticos: 2, Naturalizados: 1.
Especies: 4 | Nativas: 2, Endémicas: 0 | Exóticas: 2, Naturalizadas: 1.
Taxones: 4 | Nativos: 2, Endémicos: 0 | Exóticos: 2, Naturalizados: 1.
Taxones excluidos: 0.

Datos: Compilados a partir de Alain (1962), González-Oliva & al. (2023) y la revisión de los materiales disponibles en los herbarios HAC, HAJB, NY y US.

Citación: García-Beltrán, J.A. & López-García, A.G. 2024. *Caprifoliaceae*. Pp. 301-302. En: GEPC. Catálogo de las Plantas de Cuba. Planta! – Plantlife Conservation Society, Vancouver. https://doi.org/10.70925/cat.2024_053

Para datos adicionales o errores detectados contactar a José Angel García-Beltrán (autor para correspondencia y editor: joangelitog@gmail.com).

Abelia* ×*grandiflora (Rovelli ex André) Rehder
HÁBITO: Arbusto trepador
DISTRIBUCIÓN: Exótica cultivada (**SC**)
FORMACIONES VEGETALES: –
FÓRMULA HÍBRIDA: *Abelia chinensis* R. Br. × *A. uniflora* R. Br. (cruce artificial)
DISCUSIÓN: Existen registros de herbario que avalan su cultivo en la Sierra Maestra en la década de 1980 (Bécquer 2023, com. pers.) y en 2019 en La Gran Piedra (*E. R. Bécquer & E. Testé HFC-90666* [HAJB]; prov. Santiago de Cuba).

Lonicera japonica Thunb.
– *"Lonicera confusa"* sensu auct.
– *"Caprifolium hortense"* sensu Gómez de la Maza (1897)
HÁBITO: Arbusto trepador
DISTRIBUCIÓN: Exótica naturalizada (**SS SC Gu**), cultivada (**Hab**) | N**Ja** N**Esp** N**PRc** N**Men** N**Cay** N**AmN VM**
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano

Valeriana scandens L.
HÁBITO: Trepadora herbácea
DISTRIBUCIÓN: Nativa (**PR Art SS SC Gu**) | **Esp PRc AmN AmC AmS**
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano, bosque siempreverde mesófilo, bosque semideciduo mesófilo, complejo de vegetación de mogotes

Valeriana candolleana Gardner ≡ *Valeriana scandens* var. *candolleana* (Gardner) C. A. Müll.
HÁBITO: Trepadora herbácea
DISTRIBUCIÓN: Nativa (**PR Art SS SC Gu**) | **Esp AmN AmC AmS**
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano, bosque siempreverde mesófilo, bosque semideciduo mesófilo, complejo de vegetación de mogotes
DISCUSIÓN: Tradicionalmente reconocida como variedad de *Valeriana scandens* (Alain 1962, Acevedo-Rodríguez & Strong 2012, Greuter & Rankin 2022), dadas sus inflorescencias, flores y frutos idénticos. Sin embargo, *V. candolleana* se distingue por su tallo magenta y alado en la parte basal (vs. pardo y cilíndrico en *V. scandens*) y sus hojas simples ovado-cordiformes (vs. 3-folioladas); además *V. candolleana* es tetraploide, mientras *V. scandens* es diploide (Hammel & al. 2020). Por estas

razones, Nelson-Sutherland (2010) y Hammel & al. (2020) la consideran una especie independiente, criterio que se acepta aquí, tal como POWO (2024+).

Referencias

Acevedo-Rodríguez, P. & Strong, M.T. 2012. Catalogue of Seed Plants of the West Indies. Smith. Contr. Bot. 98. https://doi.org/10.5479/si.0081024X.98.1

Alain, Hno. 1962. Flora de Cuba V. *Rubiales-Valerianales-Cucurbitales-Campanulales-Asterales*. Río Piedras.

Bécquer, E.R. (com. pers.). 2023. Registro del cultivo de *Abelia* ×*grandiflora* en Sierra Maestra, depositado en HAJB, pero material no localizado. Jardín Botánico Nacional, Universidad de La Habana. pachyanthus@gmail.com

González-Oliva, L., Rodríguez-Alfaro, C. & Oviedo, R. 2023. Distribution of Alien Invasive Plants in Cuba. IUCN/SSC Cuban Plant Specialist Group & GBIF.org. https://doi.org/10.15468/yvbkp3

Greuter, W. & Rankin, R. 2022. Plantas Vasculares de Cuba – Inventario, ed. 3. Berlin & La Habana. https://doi.org/10.3372/cubalist.2022.1

Hammel, B.E., Grayum, M.H., Herrera, C. & Zamora, N. (ed.). 2020. Manual de Plantas de Costa Rica 4(2): 1-524. St. Louis.

Nelson-Sutherland, C. 2010. Adiciones y Comentarios a la Flora de Honduras. Ceiba 51: 70-88.

POWO. 2024+. Plants of the World Online. Kew Royal Botanic Gardens. https://powo.science.kew.org