Menispermaceae

por Luis Manuel Leyva

Géneros: 2 | Nativos: 2, Endémicos: 0 | Exóticos: 0, Naturalizados: 0.
Especies: 8 | Nativas: 8, Endémicas: 5 | Exóticas: 0, Naturalizadas: 0.
Taxones: 8 | Nativos: 8, Endémicos: 5 | Exóticos: 0, Naturalizados: 0.
Taxones excluidos: 1.

Datos: Compilados a partir de León & Alain (1951), Rhodes (1975), Mathias & Theobald (1981), Granda (1982), Granda & Fuentes (1991) y la revisión de los materiales disponibles en los herbarios HAJB, HAC, NY, y US.

Citación: Leyva, L.M. 2024. *Menispermaceae.* Pp. 759-761. En: GEPC. Catálogo de las Plantas de Cuba. Planta! – Plantlife Conservation Society, Vancouver. https://doi.org/10.70925/cat.2024_151

Para datos adicionales o errores detectados contactar a Luis Manuel Leyva (autor para correspondencia: leyvaluismanuel@gmail.com) y/o José Angel García-Beltrán (editor: joangelitog@gmail.com).

Cissampelos pareira L.
= *Cissampelos caapeba* L. ≡ *Cissampelos pareira* var. *caapeba* (L.) Eichler
= *Cissampelos microcarpa* DC.
= *Cissampelos pannosa* Turcz.
HÁBITO: Trepadora herbácea
DISTRIBUCIÓN: Nativa (**PR Art Hab May Mat IJ VC Ci SS Cam Ho Gr SC Gu**) | **Ja Esp PRc Men Bah Cay AmN AmC AmS VM**
FORMACIONES VEGETALES: Bosque semideciduo mesófilo, bosque semideciduo microfilo, bosque siempreverde mesófilo, bosque siempreverde microfilo, bosque pluvial montano, bosque nublado, bosque de galería, bosque de ciénaga, bosque de pinos montano, matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, matorral xeromorfo costero y subcostero, complejo de vegetación de mogotes, matorral secundario, sabanas antrópicas, vegetación ruderal

Cissampelos reticulata Borhidi
HÁBITO: Trepadora herbácea
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**Ho Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque siempreverde microfilo, matorral xeromorfo costero y subcostero, bosque de pinos montano (sobre lateritas)

Hyperbaena axilliflora (Griseb.) Urb. ≡ *Anomospermum axilliflorum* Griseb. ≡ *Pachygone axilliflora ('axilliflorum')* (Griseb.) M. Gómez
= *Hyperbaena longiuscula* Miers
= *Hyperbaena obovata* Urb.
= *Hyperbaena paucinervis* Urb.
= *Hyperbaena longiuscula* var. *clementis* Moldenke
= *Pachygone cubensis* var. *angustifolia* A. Gray ex Griseb. ≡ *Hyperbaena angustifolia* (Griseb.) Urb.
HÁBITO: Árbol/Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**VC Ho Gr SC Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano, bosque de pinos montano, bosque siempreverde mesófilo, bosque semideciduo mesófilo, bosque siempreverde microfilo, bosque de galería, matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina,

matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, matorral xeromorfo costero y subcostero, complejo de vegetación de mogotes

Hyperbaena columbica (Eichler) Miers ≡ *Pachygone columbica* Eichler
= *Hyperbaena crebriflora* Miers
= *Hyperbaena columbica* var. *excisa* Urb.
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**PR Art**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque de pinos de llanuras, bosque de pinos montano, bosque siempreverde mesófilo, bosque siempreverde microfilo, bosque semideciduo mesófilo, bosque de mangles (orillas), bosque de galería, matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina, complejo de vegetación de mogotes

Hyperbaena cubensis (Griseb.) Urb. ≡ *Pachygone cubensis* Griseb.
= *Hyperbaena acutifolia* Britton
= *Hyperbaena cuneifolia* Miers
= *Hyperbaena littoralis* Britton
= *Hyperbaena ovata* Urb.
= *Hyperbaena racemosa* Urb.
= *Hyperbaena cubensis* var. *parvifolia* Kitan.
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**PR Art Hab May Mat IJ VC Ci SS CA Cam LT Ho Gr SC Gu**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque de pinos montano, bosque pluvial montano, bosque pluvial de baja altitud, bosque siempreverde mesófilo, bosque siempreverde microfilo, bosque semideciduo mesófilo, bosque de galería, matorral xeromorfo costero y subcostero, matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina, complejo de vegetación de mogotes, complejo de vegetación de costa arenosa

Hyperbaena domingensis (DC.) Benth. ≡ *Cocculus domingensis* DC. ≡ *Menispermum domingense* (DC.) Spreng. ≡ *Pachygone domingensis* (DC.) Eichler
= *Anelasma jamaicense* Miers ex Benth.
= *Hyperbaena retinervis* Miers
= *Hyperbaena rotundiuscula* Miers
HÁBITO: Trepadora leñosa
DISTRIBUCIÓN: Nativa (**Ci SS CA Cam Ho SC Gu**) | **Ja Esp PRc Men AmS**
FORMACIONES VEGETALES: Bosque semideciduo mesófilo, bosque siempreverde mesófilo, bosque pluvial montano, bosque pluvial de baja altitud, bosque de galería, matorral xeromorfo costero y subcostero, complejo de vegetación de mogotes

Hyperbaena macrophylla Ekman ex Urb.
HÁBITO: Arbusto
DISTRIBUCIÓN: Endémica (**SC**)
FORMACIONES VEGETALES: Bosque semideciduo microfilo, matorral xeromorfo costero y subcostero
DISCUSIÓN: Especie incierta según Mathias & Theobald (1981), tal vez no perteneciente a *Menispermaceae*; sin embargo, la recolección tipo (*E. L. Ekman 9376* [NY!, S!]), aunque estéril, muestra caracteres vegetativos típicos del género.

Hyperbaena undulata Urb. & Ekman
HÁBITO: Árbol
DISTRIBUCIÓN: Nativa (**Gr SC Gu**) | **Esp Jam**
FORMACIONES VEGETALES: Bosque pluvial montano, bosque de galería, matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina

[***Stephania rotunda*** Lour.] [non *Stephania rotundata* Miq.]
= *Stephania glabra* (Roxb.) Miers ≡ *Cissampelos glabra* Roxb.
– *"Pericampylus glaucus"* sensu Greuter & Rankin (2022) [non *Pericampylus glaucus* (Lam.) Merr]
HÁBITO: Trepadora herbácea
TAXÓN EXCLUIDO: Exótico escasamente cultivado | **VM**
FORMACIONES VEGETALES: –
DISCUSIÓN: Hammer & al. (1990) refirieron "*Stephania rotundata* Lour." como cultivada en Cuba, con *S. glabra* y *Cissampelos glabra* como sinónimos, lo cual demuestra que su intención era indicar la presencia en el país de *S. rotunda* Lour., no *S. rotundata* Miq. (= *Pericampylus glaucus*).

Referencias

Granda, M. 1982. Consideraciones sobre la familia *Menispermaceae* Juss. en Cuba. Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 3(2): 145-157.

Granda, M & Fuentes, V.R. 1991. El género *Cissampelos* en Cuba. Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana 12: 35-42.

Greuter, W. & Rankin, R. 2022. Plantas Vasculares de Cuba Inventario, ed. 3. Berlin & La Habana. https://doi.org/10.3372/cubalist.2022.1

Hammer, K., Esquivel, M., Fuentes, V., Lima, H. & Knüpffer, H. 1990. Additional notes to the checklist of Cuban cultivated plants (1). Kulturpflanze 38: 325-343.

León, Hno. & Alain, Hno. 1951. Flora de Cuba II. Dicotiledóneas: *Casuarinaceae* a *Meliaceae*. Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio “De La Salle” 10.

Mathias, M.E. & Theobald, W.L. 1981. A revision of the genus *Hyperbaena* (*Menispermaceae*). *Brittonia* 33(1): 81-104.

Rhodes, D. G. 1975. A revision of the genus *Cissampelos*. *Phytologia* 30: 415-484.